

## Aboca Metarecod, 40 saszetek



Cena: 84,68 zł

### Opis słownikowy

Opakowanie	40 saszetek
Postać	granulat do sporządzania roztworu doustnego
Producent	ABOCA POLSKA SP. Z O.O.
Rejestracja	Wyrób medyczny

### Opis produktu

**Metarecod** to produkt wskazany do leczenia zespołu metabolicznego oraz przywracania prawidłowych wartości zmienionych parametrów metabolicznych, takich jak cholesterol, trójglicerydy, glukoza i obwód brzucha.

Metarecod, dzięki połączeniu wszystkich składników zawartych w formule, działa poprzez modyfikację właściwości fizycznych treści jelitowej, rozcieńczając stężenie tłuszczów i węglowodanów, a w szczególności:

- sprawia, że substancje są wchłaniane stopniowo (efekt retard), jednocześnie zmniejsza się ich wchłaniana ilość;
- przywraca równowagę flory jelitowej, ważną dla szybszej i bardziej stabilnej poprawy funkcji metabolicznych;
- normalizuje pasaż jelitowy, co dodatkowo sprzyja eliminacji tłuszczów (cholesterolu i trójglicerydów) oraz węglowodanów (w tym glukozy).

Ponadto produkt ogranicza wchłanianie zwrotne kwasów żółciowych, pomagając zrównoważyć poziom krążącego cholesterolu, a dzięki swojej lekkości oddziałuje między treścią jelitową (bogatą w tłuszcze i wszelkie substancje podrażniające) a błoną śluzową, sprzyjając jej ochronie. Wszystko to sprzyja lepszemu wykorzystaniu składników odżywczych przez wątrobę, pomagając w przywróceniu poziomowi glikemii, cholesterolemii, trójglicydemii i zmniejszeniu obwodu brzucha.

Stosowanie produktu powinno być połączone ze zdrowym trybem życia, obejmującym zbilansowaną dietę i regularną aktywność fizyczną.

Metarecod jest biodegradowalnym produktem, nie zawiera substancji syntetycznych, półsyntetycznych ani modyfikowanych genetycznie.

#### Wskazania:

Metarecod saszetki z granulem jest produktem zalecanym w przypadku:

- poziomu cholesterolu LDL  $\geq 100$  mg/dl lub cholesterolu HDL  $< 40$  mg/dl u mężczyzn i  $< 50$  mg/dl u kobiet;
- poziomu trójglicerydów  $\geq 150$  mg/dl;
- poziomu glukozy na czczo  $> 100$  mg/dl (IFG) lub zmienionej tolerancji glukozy (lub zmniejszonej tolerancji glukozy) 140-199 mg/dl (IGT);

- wysokich wartości obwodu brzucha nawet u osób z prawidłową masą ciała ( $\geq 94$  cm u mężczyzn i  $\geq 80$  cm u kobiet).

Wszystko to może prowadzić do zmian parametrów metabolicznych typowych dla zespołu metabolicznego, stan, który występuje, gdy są obecne trzy zmiany, w tym z wysokim ciśnieniem krwi.


Produkt, poprzez działanie na jelito, będące ważnym organem w prawidłowym zarządzaniu metabolizmem, jest w stanie przywrócić prawidłowe wartości tych parametrów, zarówno wtedy, gdy nieprawidłowości występują oddzielnie, jak i razem. Metarecod saszetki z granulatem jest wskazany dla dorosłych i dzieci od 8. roku życia.

#### Czas trwania leczenia:

Pomimo, że pierwsza poprawa następuje już po pierwszym miesiącu kuracji, zaleca się przyjmowanie produktu przez co najmniej 3 miesiące. Możliwe jest powtarzanie cyklu leczenia wielokrotnie w ciągu roku.

#### **Dawkowanie i sposób użycia:**

Wysypać zawartość saszetki do połowy szklanki wody. Spożywać przed dwoma głównymi posiłkami, zanim otrzymany napój utworzy w szklance konsystencję żelu. Po spożyciu należy wypić kolejne pół szklanki wody.



Produkt nie może być przyjmowany bezpośrednio do ust, należy spożywać go wyłącznie po uprzednim zmieszaniu z wodą. W przypadku gdy zapomni się spożyć Metarecod przed posiłkiem, można go zażyć również podczas posiłku. W pierwszych dniach stosowania mogą wystąpić wzdęcia, które ustępują samoistnie w miarę kontynuowania leczenia.

W celu prawidłowego spożycia produktu przez dzieci poniżej 12. roku życia zalecana jest obecność osoby dorosłej.

#### **Ostrzeżenia i środki ostrożności:**

Nie spożywać produktu w przypadku alergii lub indywidualnej nadwrażliwości na jeden lub więcej z poniższych surowców, z których otrzymywane są składniki produktu: Avena sativa, Opuntia ficus-indica, Amorphophallus konjac, Althaea officinalis, Linum usitatissimum, Tilia platyphyllos, Cichorium intybus, Stevia rebaudiana, guma arabska.

Nie istnieją wyniki badań dotyczące stosowania Metarecod w okresie ciąży i laktacji. Jednak ze względu na właściwości składników produktu, nie ma przeciwwskazań do jego stosowania w tych okolicznościach. Należy pamiętać, że leczenie dysglikemii, dyslipidemii, nadwagi i zespołu metabolicznego w okresie ciąży powinno być przeprowadzane pod opieką lekarza. Zaleca się spożywanie produktu co najmniej dwie godziny po zażyciu leków w celu uniknięcia możliwej interakcji podczas ich wchłaniania.

#### **Skład:**

Kompleks na bazie makrocząsteczek polisacharydowych (NeoPolicaptil Gel Retard 86%); naturalny aromat z pomarańczy i brzoskwini; guma arabska; sproszkowane liście stevia. NeoPolicaptil Gel Retard jest kompleksem na bazie makrocząsteczek, będącym owocem badań Aboca, realizowanym za pomocą technologii produkcyjnej, która pozwala na uzyskanie w produkcie bez składników syntetycznych.