


## Artemisol płyn do stosowania na skórę 0,873g/ml 100 ml



Cena: 14,35 zł

### Opis słownikowy

Dawka	0,873 g/ml
Opakowanie	100 ml
Postać	płyn do stos.na skórę
Producent	KRAKOWSKIE ZAKŁADY ZIELARSKIE "HERBAPOL" W KRAKOWIE S.A.
Rejestracja	Lek ziołowy
Substancja czynna	Absinthi et Tanaceti herbae tinctura

### Opis produktu

**Nazwa:** Artemisol  
**Postać:** płyn do stos.na skórę  
**Dawka:** 0,873 g/ml  
**Opakowanie:** 100 ml  
**Skład:**

Preparat stanowi mieszaninę nalewki piołunowo-wrotyczowej (Absinthi et Tanaceti herbae tinctura), w stos. (1:5) z kwasem octowym 80%. Zawiera 60-65% v/v etanolu i od 2 do 3,2% kwasu octowego.

#### Działanie:

- trujące na świerzbowce oraz wszy

#### Wskazania:

Wszawica głowowa.

Produkt przeznaczony jest do tradycyjnego stosowania w wymienionych wskazaniach i jego skuteczność opiera się wyłącznie na długim okresie stosowania i doświadczeniu.

#### Przeciwwskazania:

Otwarte rany i ostre stany zapalne skóry głowy. Uczulenie na preparat lub na rośliny z rodziny złożonych (Asteraceae=Compositae).

#### Działania niepożądane:

Podrażnienia skóry. W razie przypadkowego połykania leku mogą wystąpić zaburzenia w funkcjonowaniu układu pokarmowego, krwionosnego i nerwowego. W przypadku zauważenia innych działań niepożądanych zwrócić się do lekarza.

**Interakcje:**

Nie stosować równocześnie z szamponem. Środki powierzchniowo czynne mogą spowodować wchłonięcie przez skórę substancji owadobójczych.

**Dawkowanie:**

Tradycyjnie stosuje się podany schemat stosowania: włosy zwilżyć obficie płynem, zawiązać chustką lub folią i pozostawić na 2-3 godziny. Następnie dokładnie umyć włosy wodą i wyczesać gęstym grzebieniem.

**Środki ostrożności:**

Produkt może być stosowany u dzieci w wieku szkolnym. Stosować nie częściej niż dwa razy w miesiącu. Nie połykać. W przypadku dostania się preparatu na śluzówkę oka przepłukać pod bieżącą wodą. Nie stosować w pobliżu otwartego ognia.

**Prowadzenie pojazdów:**

Produkt stosowany zewnętrznie. Dotychczas nie stwierdzono negatywnego wpływu.

**Przedawkowanie:**

Produkt stosowany zewnętrznie. Przypadki przedawkowania dotychczas nie są znane.

**Ciąża:**

Brak danych na temat bezpieczeństwa stosowania produktu w okresie ciąży i karmienia piersią.