

## Ascorutical Forte tabletki powlekane 20 sztuk



Cena: 12,15 zł

### Opis słownikowy

Dawka	-
Opakowanie	20 tabl.
Postać	tabl.powl.
Producent	LABORATOIRE CHAUVIN S.A.
Rejestracja	Suplement diety
Substancja czynna	Ascorbic acid, Rutosidum, Calcium

### Opis produktu

**Nazwaś:** Ascorutical Forte

**Postaćś:** tabl.powl.

**Dawkaś:** 0,2g+0,05g+0,5g

**Opakowanieś:** 20 tabl. (2 blist.po 10 szt.)

**Składś:** - Witamina C (Kwas askorbowy) - 200 mg  
- Rutyna - 50 mg  
- Wapń (jako węglan wapnia) - 200 mg

**Działanieś:** - Witamina C (Kwas askorbowy): uczestniczy w produkcji przeciwciał podnosząc odporność organizmu, zapewnia prawidłową strukturę włókien kolagenowych, zmniejsza tym samym przenikanie drobnoustrojów chorobotwórczych do wnętrza organizmu. Działa przeciwutleniająco (usuwa wolne rodniki - chroni organizm przed starzeniem i uszkodzeniem komórek). Ułatwia wchłanianie żelaza i bierze udział w syntezie hemoglobiny.

- Rutyna: chroni witaminę C przed utlenieniem i wspomaga jej przeciwobrzękowe i przeciwzapalne działanie. Uszczelnia ściany naczyń krwionośnych uniemożliwiając przenikanie drobnoustrojów do krwi i ich rozprzestrzenianie po całym organizmie. Zmniejsza obrzęk śluzówki nosa (katar) i gardła łagodząc przebieg infekcji.

- Wapń: usprawnia przewodnictwo nerwowe, wpływa na wydzielanie hormonów i neuroprzekaźników, tym samym poprawia samopoczucie. Ponadto wpływa na przepuszczalność naczyń krwionośnych, zmniejsza wysięki, obrzęki, zapobiega przenikaniu drobnoustrojów do krwi i ich rozprzestrzenianiu po całym organizmie. Wpływa na budowę kości.

**Wskazaniaś:** Lek stosuje się wspomagająco:

- w przebiegu chorób infekcyjnych (przeziębienie, grypa, itp.);
- w schorzeniach charakteryzujących się nadmierną przepuszczalnością naczyń (żylaki, obrzęki, krwiaki pourazowe);
- chorobach alergicznych (katar sienny, pokrzywka, nadwrażliwość na światło).

ś: Nadwrażliwość na składniki preparatu, Hiperkalcemia (np. u pacjentów z nadczynnością gruczołów przytarczycznych, hiperwitaminozą D, szpiczakiem mnogim lub przerzutami do kości), ciężka niewydolność nerek, jednoczesne przyjmowanie sulfonamidów i aminoglikozydów.

**Dawkowanie (dorośli)ś:** - zapobiegawczo: 1 tabletkę 2 razy na dobę;  
- leczniczo: 2 tabletki 2 razy na dobę

**Dawkowanie (dzieci)ś:** Dzieci powyżej 5 roku życia:  
zapobiegawczo i leczniczo 1 tabletkę na dobę