NZOZ "Centrum" Klaudiusz Such
Krakowska 10, Dębica
+48 515 041 759

BOIRON Cocculine, 30 tabletek

Cena: 21,62 zł

Opis słownikowy

Opakowanie	30 tabletek
Postać	tabletki
Producent	BOIRON S.A.
Rejestracja	Lek

Opis produktu

Co to jest lek Cocculine® i w jakim celu się go stosuje:

Cocculine® jest lekiem stosowanym wspomagająco w objawach choroby lokomocyjnej (np.: nudności, ogólne złe samopoczucie) podczas podróży samochodowej, lotniczej lub morskiej.

Jak stosować Cocculine:

Sposób użycia:

Ten lek należy zawsze stosować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta, lub według zaleceń lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.
W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.
Stosować doustnie.

Zalecana dawka to:

- Dorośli, młodzież i dzieci w wieku od 5 lat:

• w przeddzień i w dniu podróży ssać powoli po 2 tabletki 3 razy dziennie,
• od momentu wystąpienia pierwszych objawów choroby w czasie podróży, ssać powoli po 2 tabletki, zwiększając odstępy pomiędzy kolejnymi dawkami leku w miarę następowania poprawy.
W momencie ustąpienia objawów należy zaprzestać przyjmowania leku.
Nie przekraczać dawki 6 tabletek w ciągu doby.

- Dzieci w wieku do 5 lat: według wskazań lekarza.

Ze względu na niebezpieczeństwo zakrztuszenia, dzieciom w wieku do 5 lat lub dzieciom starszym, które mają problem z połykaniem, zaleca się rozdrobnienie tabletek i podanie w niewielkiej ilości wody.

Przyjęcie większej niż zalecana dawki leku Cocculine

Należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Pominięcie przyjęcia leku Cocculine:

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W razie jakichkolwiek dalszych wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza, farmaceuty lub pielęgniarki.

Co zawiera Cocculine:

Skład:

- Substancjami czynnymi w 1 tabletce leku są:

Cocculus indicus 4 CH 0,375 mg, Nux vomica 4 CH 0,375 mg, Tabacum 4 CH 0,375 mg, Petroleum rectificatum 4 CH 0,375 mg.

- Pozostałe składniki to: sacharoza, laktoza, stearynian magnezu.

Informacje ważne przed zastosowaniem Cocculine:

Kiedy nie stosować Cocculine:

Jeśli pacjent ma uczulenie na substancje czynne lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.

Ostrzeżenia i środki ostrożności:
Przed rozpoczęciem stosowania leku Cocculine® u dzieci w wieku do 5 lat należy omówić to z lekarzem, farmaceutą lub pielęgniarką.

Cocculine a inne leki:

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Stosowanie leku Cocculine z jedzeniem i piciem:

Brak specjalnych wymagań.

Ciąża i karmienie piersią:

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn:

Brak danych wskazujących na niekorzystny wpływ leku Cocculine® na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługi maszyn.

W razie jakichkolwiek wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Cocculine® zawiera sacharozę i laktozę.
W przypadku występowania nietolerancji niektórych cukrów należy skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Możliwe działania niepożądane:

Brak znanych działań niepożądanych.
Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

Jak przechowywać Cocculine:

Przechowywanie:

Brak specjalnych zaleceń dotyczących przechowywania leku.
Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.
Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na pudełku i blistrze.
Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę, jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.