

Fenistil żel, 30 g

Cena: 21,96 zł



Opis słownikowy

Dawka	1 mg/g
Opakowanie	30 g
Postać	żel
Producent	GLAXOSMITHKLINE CONSUMER HEALTHCARE SP. Z O.O.
Rejestracja	Lek
Substancja czynna	Dimetynden

Opis produktu

The advertisement features a scenic background of a field with a family sitting on the grass. A semi-transparent box contains the text: 'Szybka ulga na wszelkie podrażnienia skóry' followed by 'Fenistil to lek przeciwhistaminowy do stosowania miejscowego w celu złagodzenia swędzenia wywołanego ukąszeniami owadów, wysypkami skórnymi, pokrzywką, oparzeniami powierzchniowymi lub słonecznymi*'. To the right, a product box is shown with the text 'Lek przeciwhistaminowy o miejscowym działaniu przeciwsłonecznym i przeciwuczuleniowym' and a small asterisked note '*pierwszego stopnia'.

Co to jest lek Fenistil i w jakim celu się go stosuje?

Lek Fenistil ma postać żelu do stosowania na skórę. Fenistil zawiera substancję czynną dimetyndenu maleinian, który hamuje działanie histaminy – związku odpowiedzialnego za reakcje alergiczne. Lek stosowany na skórę działa miejscowo przeciwuczuleniowo, silnie przeciwsłoneczowo (z wyłączeniem świądu cholestatycznego), zmniejsza obrzęk, łagodzi podrażnienia. Wykazuje miejscowe właściwości znieczulające. Chłodzi, co dodatkowo łagodzi podrażnioną skórę.

Wskazania do stosowania:

Świąd towarzyszący chorobom skóry, pokrzywce, ukąszeniom owadów, oparzeniom słonecznym, powierzchownym oparzeniom skóry (pierwszego stopnia).

Jak stosować lek Fenistil:

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z opisem w ulotce dla pacjenta lub według wskazań lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Lek jest przeznaczony do stosowania na skórę.

Zwykle, o ile lekarz nie zaleci inaczej, lek należy stosować 2 do 4 razy na dobę, pokrywając cienką warstwą żelu zmienioną chorobowo i swędzącą powierzchnię skóry.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Fenistil:

Nie odnotowano przypadków przedawkowania żelu Fenistil stosowanego miejscowo na skórę.

W razie połknięcia leku, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

W przypadku wątpliwości dotyczących stosowania leku należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Pominięcie zastosowania leku Fenistil:

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

Co zawiera lek Fenistil

- Substancją czynną leku jest dimetyndenu maleinian. Jeden gram żelu zawiera 1 mg dimetyndenu maleinianu.
- Pozostałe składniki leku to: benzalkoniowy chlorek, sodu wersenian, karbomer (karbopol 974 P), sodu wodorotlenek 30%, glikol propylenowy, woda oczyszczona.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Fenistil:

Kiedy nie stosować leku Fenistil:

- jeśli pacjent ma uczulenie na substancję czynną lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
- w przypadku oparzeń drugiego i trzeciego stopnia.

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

- W przypadku stosowania leku Fenistil na rozległą powierzchnię skóry, należy unikać ekspozycji miejsc nim pokrytych na działanie promieni słonecznych.
- Należy poinformować lekarza w przypadku bardzo nasilonego świądu lub rozległych zmian.

W przypadku wątpliwości dotyczących stosowania leku Fenistil żel należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą przed jego zastosowaniem.

Dzieci:

Należy unikać stosowania leku u małych dzieci na duże powierzchnie skóry, zwłaszcza w przypadkach zranień, oparzeń i stanów zapalnych skóry.

Lek Fenistil a inne leki:

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Ciąża i karmienie piersią:

W czasie ciąży i karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Nie należy stosować leku na rozległą powierzchnię skóry, zwłaszcza przy jej zranieniach i stanach zapalnych.

W okresie karmienia piersią nie stosować na brodawki sutków.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn:

Fenistil stosowany na skórę nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie urządzeń mechanicznych.

Lek Fenistil zawiera:

- glikol propylenowy - lek może powodować podrażnienie skóry.
- chlorek benzalkoniowy - lek podrażnia, może powodować reakcje skórne.

Możliwe działania niepożądane:

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych)

- Suchość skóry.
- Uczucie pieczenia skóry.
- Skórne reakcje alergiczne obejmujące wysypkę i swędzenie skóry.

Jak przechowywać lek Fenistil:

Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C. Chronić od światła. Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Nie stosować tego leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu. Termin ważności oznacza ostatni dzień podanego miesiąca.

Leków nie należy wyrzucać do kanalizacji ani domowych pojemników na odpadki. Należy zapytać farmaceutę jak usunąć leki, których się już nie używa. Takie postępowanie pomoże chronić środowisko.

Często zadawane pytania odnośnie leku Fenistil i odpowiedzi na nie:

1. Czym jest Fenistil żel i jak działa?

Fenistil żel to lek stosowany bezpośrednio na skórę, który łagodzi swędzenie i uczucie pieczenia.

2. Jakie objawy łagodzi Fenistil żel?

Fenistil żel łagodzi swędzenie skóry spowodowane ukąszeniami owadów, drobnymi oparzeniami, oparzeniami słonecznymi, a także pokrzywkę i wysypki.

3. Jak szybko działa Fenistil żel?

Fenistil w postaci żelu szybko penetruje w głąb skóry, po kilku minutach rozpoczyna się jego działanie przeciwhistaminowe. Podłoże żelu ułatwia przenikanie substancji czynnej w głąb skóry. Chłodzi, co dodatkowo łagodzi podrażnioną skórę.

4. Czy Fenistil żel jest skomplikowany w użyciu?

Nie, stosowanie żelu jest bardzo proste: wystarczy 2-4 razy dziennie nanieść cienką warstwę żelu na zmienioną chorobowo lub swędzącą skórę. Jeśli objawy nie ustąpią po upływie tygodnia, należy skonsultować się z lekarzem.