

Fervex, granulat do sporządzania roztworu doustnego, smak cytrynowy, 12 saszetek

Cena: 25,20 zł



Opis słownikowy

Dawka	500 mg + 200 mg+ 25 mg
Opakowanie	12 saszetek
Postać	granulat do sporządzania roztworu doustnego
Producent	UPSA SAS
Rejestracja	Lek
Substancja czynna	Paracetamol, Kwas askorbowy, Maleinian feniraminy

Opis produktu

FERVEX, granulat do sporządzania roztworu doustnego, 12 saszetek

Fervex jest lekiem złożonym. Paracetamol działa przeciwbólowo i przeciwgorączkowo. Maleinian feniraminy zmniejsza przekrwienie i obrzęk błon śluzowych, przez co udrażnia przewody nosowe, hamuje odruch kichania i łzawienie oczu. Kwas askorbowy uzupełnia niedobory witaminy C w organizmie. Lek wskazany do stosowania powyżej 15 roku życia.

Wskazania:

Doraźne leczenie objawów grypy, przeziębienia i stanów grypopodobnych (ból głowy, gorączka, zapalenie błony śluzowej nosa i gardła) u dorosłych i dzieci powyżej 15 lat.

Przeciwwskazania:

Nadwrażliwość na którykolwiek składnik preparatu. Ciężka niewydolność wątroby lub nerek, jaskra z wąskim kątem, rozrost gruczołu krokowego z towarzyszącą retencją moczu, dzieci poniżej 15 lat, pacjenci z nietolerancją fruktozy, zespół złego wchłaniania glukozy-galaktozy lub niedoborem sacharazy-izomaltazy (zawiera sacharozę).

Dawkowanie:

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 15 lat: 1 saszетка 2 lub 3 razy na dobę. Przerwy w podawaniu kolejnych dawek powinny wynosić co najmniej 4 godziny. W przypadku zaburzenia czynności nerek (klirens kreatyniny poniżej 10 ml/min), należy zachować co najmniej 8 godzinne przerwy pomiędzy dawkami. Zawartość saszетки należy rozpuścić w szklance gorącej lub zimnej wody. Preparatu nie należy stosować dłużej niż 5 dni bez porozumienia z lekarzem. W leczeniu stanów grypopodobnych lepiej jest przyjmować lek rozpuszczony w gorącej wodzie, wieczorem, jak najszybciej od wystąpienia objawów.

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

Ryzyko wystąpienia uzależnienia psychicznego przy stosowaniu dawek większych niż zalecane i długotrwałym leczeniu, aby uniknąć przedawkowania, należy sprawdzić czy inne przyjmowane leki nie zawierają paracetamolu (u osób dorosłych o masie ciała powyżej 50 kg, całkowita dawka dobową paracetamolu nie może być większa niż 4 g/ dobę).

Picie napojów alkoholowych lub przyjmowanie środków uspokajających (zwłaszcza barbituranów) nasila działanie uspokajające leków przeciwhistaminowych, dlatego należy unikać jednoczesnego ich przyjmowania. Szczególne ryzyko uszkodzenia wątroby istnieje u pacjentów głodzonych i regularnie pijących alkohol. Paracetamol należy stosować ostrożnie u pacjentów z niedoborem dehydrogenazy glukozy-6-fosforanowej (G-6-PD). Może zaburzać zdolność prowadzenia pojazdów i obsługi urządzeń mechanicznych w ruchu.

Dodatkowe informacje:

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Skład:

Jedna saszetka zawiera:

- paracetamol 500 mg,
- kwas askorbowy 200 mg,
- maleinian feniraminu 25 mg

Podmiot odpowiedzialny:

UPSA SAS,
 Francja

Dystrybutor:

MagnaPharm Poland Sp. z o.o.,
 Al. Jerozolimskie 146 D,
 02-305 Warszawa

Galeria

