

Labofarm Tabletki z czosnku 300 mg, 60 tabletek

Cena: 18,99 zł



Opis słownikowy

Dawka	300 mg
Opakowanie	60 tabletek
Postać	tabletki
Producent	LABORATORIUM FARMACEUTYCZNE LABOFARM SP. Z O.O. SP.KOMANDYT.
Rejestracja	Lek ziołowy
Substancja czynna	cebula czosnku

Opis produktu

Wskazania:

Pomocniczo w profilaktyce miażdżycy oraz jako lek łagodzący objawy przeziębienia. Tradycyjny produkt leczniczy roślinny do stosowania w wymienionych wskazaniach, wynikających wyłącznie z jego długotrwałego stosowania.

Według danych literaturowych przyjmowanie sproszkowanego czosnku powodowało zmniejszenie poziomu cholesterolu i trójglicerydów w osoczu zdrowych ochotników oraz u pacjentów z łagodną hiperlipidemią. Składniki czosnku wykazywały też działanie przeciwzakrzepowe (przeciwagregacyjne) oraz obniżające ciśnienie krwi (hipotensyjne) u zdrowych ochotników.

Przeciwwskazania:

Nie stosować leku w przypadku nadwrażliwości na czosnek lub związki siarkowe oraz pozostałe składniki leku.

Dawkowanie i sposób użycia:

Droga podania: doustna.

Dawkowanie: W profilaktyce miażdżycy, dorośli: od 2 do 3 tabletek 3 razy na dobę.

W przeziębieniu, dorośli i młodzież w wieku powyżej 12 lat: od 2 do 3 tabletek od 3 do 4 razy na dobę. Stosowanie rozpocząć po wystąpieniu pierwszych objawów przeziębienia.

Przedawkowanie:

Brak doniesień na temat toksycznego działania. W przypadku znacznego przekroczenia dawek zalecanych należy skontaktować się z lekarzem.

Postępowanie w przypadku pominięcia dawki leku:

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia pominiętej dawki.

W celu uzyskania wyjaśnień, co do stosowania leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

Działania niepożądane:

Po zastosowaniu produktu może dojść do zmiany zapachu skóry lub wydychanego powietrza. W rzadkich przypadkach lek może

powodować podrażnienie przewodu pokarmowego lub reakcje alergiczne.

Interakcje:

Równoczesne stosowanie preparatu z lekami obniżającymi krzepliwość krwi (np. salicylany, warfaryna) może spowodować nasilenie ich działania.

Preparat może zmieniać metabolizm leków transportowanych przez glikoproteinę P oraz leków metabolizowanych przez izoenzymy cytochromu P-450.

Równoczesne stosowanie czosnku z lekami przeciwwirusowymi z grupy inhibitorów proteazy (np. indinawir, sakwinawir) może obniżyć ich stężenie we krwi.

Ciąża i karmienie piersią:

Ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa stosowania w okresie ciąży lub laktacji nie zaleca się stosowania produktu w tym czasie. Obecne w preparacie związki siarkowe przechodzą do mleka matki

Prowadzenie pojazdów i obsługiwane maszyn:

Brak wpływu.

Przechowywanie:

Przechowywać w zamkniętym opakowaniu, w temperaturze nie wyższej niż 25°C, w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci.

Nie stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

Skład:

Każda tabletkę zawiera 300 mg *Allium sativum* L., bulbus (cebula czosnku).

Substancje pomocnicze: krzemu dwutlenek koloidalny bezwodny