

Pedicetamol 100 mg/ml, roztwór doustny, 30 ml



Cena: 17,07 zł

Opis słownikowy

Dawka	100 mg/ml
Opakowanie	30 ml
Postać	roztwór doustny
Producent	POLSKI LEK
Rejestracja	Lek
Substancja czynna	Paracetamol

Opis produktu

Pedicetamol® zawiera paracetamol, który należy do grupy leków przeciwbólowych i przeciwgorączkowych. Lek jest stosowany w celu obniżenia gorączki trwającej nie dłużej niż 3 dni i uśmierzania bólu o nasileniu łagodnym do umiarkowanego. Jeśli nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, gorączka nie ustąpi po 3 dniach lub jeśli ból nie ustąpi po 3 dniach u dzieci lub 5 dniach u dorosłych (2 dni w przypadku bólu gardła), należy zwrócić się do lekarza.

Jedyny od pierwszych dni życia w dawce 100 mg/ml.

75% mniej płynu do połknięcia dla dziecka w porównaniu do innych paracetamoli dla dzieci dostępnych na rynku w stężeniu 24 mg/ml. Skoncentrowana dawka leku oznacza dla Twojego dziecka mniej płynu do połknięcia, a dla Ciebie łatwiejszą podaż leku za pomocą wygodnego kroplomierza z podziałką.

*podanie leku dzieciom poniżej 3 roku życia wymaga konsultacji z lekarzem

Dawkowanie i sposób użycia:

Należy koniecznie stosować się do dawkowania określonego na podstawie masy ciała dziecka

i w ten sposób określić odpowiednią dawkę wyrażoną w mililitrach (ml) roztworu doustnego.
 Dawkowanie co 6 godzin w mililitrach (ml):

Dawkowanie co 6 godzin w mililitrach (ml):

Dawka w ml	0,4	0,5	0,6	0,7	0,8	0,9	1,0	1,1	1,2	1,3	1,4	1,5	1,6	1,7	1,8	1,9	2,0	ml
Masa ciała w kg	2,7	3,3	4	4,7	5,3	6	6,7	7,3	8	8,7	9,3	10	10,7	11,3	12	12,7	13,3	kg
Orientacyjny wiek w miesiącach	od 0 do 3			od 4 do 8			od 9 do 11			od 12 do 23			od 24 do 36			m-cy		

Dawka w ml	2,2	2,4	2,6	2,8	3,0	3,2	3,4	3,6	3,8	4,0	4,2	4,4	4,6	4,8	ml
Masa ciała w kg	14,7	16	17,3	18,7	20	21,3	22,7	24	25,3	26,7	28	29,3	30,2	32	kg
Orientacyjny wiek w latach	4 do 5			6 do 8			9 do 10						lat		

U dzieci w wieku poniżej 3 lat zaleca się podawanie roztworu za pomocą zakraplacza dołączonego do opakowania 30 ml.

U dzieci w wieku od 3 lat zaleca się podawanie roztworu za pomocą strzykawki dołączonej do opakowania 60 ml.

Jeżeli pożądane działanie nie zostanie osiągnięte w ciągu 3-4 godzin, lek może być podawany co 4 godziny. W takim przypadku odpowiednią dawkę należy wyliczyć zgodnie z poniższą instrukcją:

masa ciała dziecka w kilogramach (kg) x 0,1 x dawka leku Pedicetamol® w mililitrach (ml)

Nie należy przekraczać maksymalnej dawki dobowej 60 mg/kg/dobę bez uprzedniego skonsultowania się z lekarzem.

Ostrzeżenia i środki ostrożności:

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Skład:

Substancją czynną leku jest paracetamol. 1 ml roztworu zawiera 100 mg paracetamolu.

Nie stosować w przypadku uczulenia na paracetamol lub którykolwiek z pozostałych

składników tego leku.

Inne składniki leku to: makrogol 600, glicerol, aromat malinowy (glikol propylenowy, alkohol etylowy i alkohol benzyłowy), sacharyna sodowa, azorubina (E122).

Pliki do pobrania:
Ulotka dla pacjenta