

# Rivanolum 0,1% AMARA, płyn do stosowania na skórę, 100 ml

Cena: 3,99 zł



## Opis słownikowy

Dawka	0,1%
Opakowanie	100 ml
Postać	płyn do stosowania na skórę
Producent	ZAKŁAD FARMACEUTYCZNY AMARA SP. Z O.O.
Rejestracja	Lek
Substancja czynna	Mleczan etakrydyny

## Opis produktu

### Zastosowanie:

Lek Riwanol (Rivanolum) to roztwór o działaniu bakteriobójczym. Jest stosowany w leczeniu zainfekowanych, trudno gojących się ran na skórze i błonach śluzowych.

### Działanie:

Jest stosowany w leczeniu zainfekowanych, trudno gojących się ran na skórze i błonach śluzowych.

### Wskazania:

Do odkażania skóry i błon śluzowych oraz powierzchniowych uszkodzeń powłok ciała.

### Przeciwwskazania:

Nie należy stosować leku u pacjentów z nadwrażliwością na etakrydynę i inne pochodne akrydynowe.

### Sposób użycia:

Do stosowania miejscowego na skórę.

Przemywać miejsca zmienione chorobowo na skórze kilka razy na dobę lub stosować w postaci okładów, przymoczek lub płukań.

### Dzieci:

Stosowanie u dzieci tylko na zlecenie lekarza.

### Możliwe działania niepożądane:

RIVANOLUM roztwór 0,1%, może wywoływać reakcje alergiczne (zaczernienie, świąd, pieczenie skóry). Bardzo rzadko: kontaktowe zapalenie skóry.

### Interakcje z innymi produktami leczniczymi i inne rodzaje interakcji:

Nie należy stosować ze środkami o działaniu utleniającym (nadmanganian potasu, nadtlenek wodoru), garbnikami (tanina), substancjami o charakterze anionowym (glikol polietylenowy) oraz z roztworem boranu sodu, kwasu salicylowego, chlorku sodu. Występuje synergiczny efekt działania z chlorowodorkiem tetracykliny.

**Wpływ na płodność, ciążę i laktację:**

Nie zaleca się stosowania u kobiet w ciąży i w okresie laktacji, ze względu na brak badań klinicznych tego produktu. Stosowanie jest możliwe, ale tylko wtedy, gdy spodziewane korzyści dla matki przewyższają potencjalne ryzyko dla płodu lub karmionego dziecka.

**Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn:**

RIVANOLUM roztwór 0,1% nie ma wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn

**Ostrzeżenia i środki ostrożności:**

Nie stosować na duże powierzchnie ciała. Ze względu na możliwość zabrudzenia unikać kontaktu leku z odzieżą lub bielizną pościelową. W celu usunięcia plamy, należy zabrudzone miejsce zwilżyć sokiem z cytryny, a następnie całość wyprać.

Należy unikać kontaktu produktu z oczami, a w razie przedostania się produktu leczniczego do oczu, należy go usunąć obficie spłukując wodą.

W razie omyłkowego wypicia produktu leczniczego, pacjent powinien natychmiast skontaktować się z lekarzem.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

**Skład:**

Substancja czynna: Mleczan etakrydiny 1mg/g, substancja pomocnicza: woda oczyszczona.

**Inna nazwa:**

Ethacridini lactas