

## Rowatinex, 30 kapsułek



Cena: 14,52 zł

### Opis słownikowy

Opakowanie	30 kapsułek
Postać	kapsułki miękkie
Producent	ROWA-WAGNER GMBH AND CO. KG
Rejestracja	Lek

### Opis produktu

#### Lek Rowatinex

- Ułatwia rozpad kamieni i ich wydalanie
- Działa moczopędnie, rozkurczowo i przeciwbólowo
- Wywiera efekt przeciwzapalny i przeciwbakteryjny
- Zwiększa skuteczność zabiegu litotrypsji
- Zapobiega powstawaniu nowych kamieni
- Łagodzi objawy CP/CPPS
- Dobrze tolerowany również w podeszłym wieku
- Leczenie i profilaktyka kamicy moczowej i dolegliwości dróg moczowych oraz łagodzenie objawów im towarzyszących
- Po zabiegu litotrypsji, w celu zapobiegania kamicy resztkowej

#### Co to jest lek Rowatinex i w jakim celu się go stosuje:

Rowatinex jest lekiem, który działa moczopędnie oraz łagodnie rozkurczająco na drogi moczowe, ułatwiając wydalanie małych złogów kamieni nerkowych.

#### Wskazania:

Pomocniczo w przypadku stwierdzenia małych złogów kamieni nerkowych (tzw. "piasku nerkowego").

#### Przeciwwskazania:

Nie należy stosować leku Rowatinex w przypadku:

- nadwrażliwości na którykolwiek składnik preparatu Rowatinex,
- ciąży,
- okresu karmienia piersią,
- ostrych lub przewlekłych schorzeń nerek.

Zachować szczególną ostrożność stosując Rowatinex jeśli: wystąpiły objawy bólowe, zwłaszcza w okolicy lędźwiowej, kolka nerkowa (charakteryzująca się nawracającym bólem zazwyczaj rozpoczynającym się w okolicy lędźwiowej lub w okolicy nerki), zaburzeniami w oddawaniu moczu, krwimocz, itp. W przypadku wystąpienia powyższych objawów należy skontaktować się z lekarzem.

**Stosowanie leku Rowatinex u dzieci:**  
Leku nie należy stosować u dzieci.

**Stosowanie leku Rowatinex z jedzeniem i pićm:**  
Lek należy przyjmować 30 minut przed posiłkiem.

**Dawkowanie i sposób użycia:**

Jeśli lekarz nie zaleci inaczej 1 kapsułka, 3-4 razy na dobę, 30 minut przed posiłkami. Sposób użycia: Doustnie. Zaleca się przyjmowanie zwiększonej ilości płynów niż normalnie w czasie przyjmowania preparatu. W przypadku wrażenia, że działanie leku Rowatinex jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza.

*W przypadku zażycia większej dawki leku Rowatinex niż zalecana:*

Dotychczas nie odnotowano przypadków przedawkowania leku Rowatinex, W razie przyjęcie większej niż zalecana dawki, należy niezwłocznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Leczenie zatrucia: Jeśli lek został przyjęty niedawno, żołądek należy opróżnić stosując płukanie żołądka. Chory powinien być pod stałą obserwacją. W razie konieczności należy zastosować leczenie objawowe. Zaleca się monitorowanie czynności serca, wydolności oddechowej oraz wykonanie badań laboratoryjnych.

**Możliwe działania niepożądane:**

Jak każdy lek, Rowatinex może powodować działania niepożądane. U niewielkiej liczby pacjentów mogą wystąpić lekkie, przejściowe objawy ze strony żołądka, np. nudności. W przypadku wystąpienia wymiotów lub utrzymywania się innych objawów należy przerwać stosowanie leku. U niektórych osób w czasie stosowania leku Rowatinex mogą wystąpić inne działania niepożądane. W przypadku wystąpienia innych działań niepożądanych nie wymienionych w tej ulotce, należy poinformować o nich lekarza.

**Interakcje:**

Dotychczas nie stwierdzono przypadków interakcji z innymi lekami, jednakże na podstawie danych doświadczalnych dla olejków eterycznych można przypuszczać, że przyjęcie leku może mieć wpływ na metabolizm innych leków, objawiający się osłabieniem ich działania. Należy poinformować lekarza o wszystkich przyjmowanych ostatnio lekach, nawet tych, które wydawane są bez recepty.

**Ciąża:**

Nie stosować w okresie ciąży.

**Karmienie piersią:**

Nie stosować w okresie karmienia piersią.

**Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn:**

Dotychczas nie wykazano wpływu.

**Przechowywanie:**

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. Przechowywać w temperaturze poniżej 25 °C. Nie stosować leku po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.

**Skład:**

Jedna kapsułka zawiera:

- alfa-pinenum 24,8 mg
- beta-pinenum 6,2 mg
- Camphenum 15,0 mg,
- Cineolum 3,0 mg
- Fenchonum 4,0 mg,
- Borneolum 10,0 mg,
- Anetholum 4,0 mg

Substancje pomocnicze:

- Olej z oliwek 33,0 mg

Powłoczka kapsułki: żelatyna wołowa, glicerol 85%, etylu parahydroksybenzoesan sodowy, propylu parahydroksybenzoesan sodowy, żółcień pomarańczowa FCF 85% (E110), żółcień chinolinowa WS 70% (E104)