


Vagical, 10 globulek dopochwowych



Cena: 21,64 zł

Opis słownikowy

Dawka	1,5 g
Opakowanie	10 globulek
Postać	globulki dopochwowe
Producent	FARMINA SP. Z O.O.
Rejestracja	Lek homeopatyczny

Opis produktu

Co to jest Vagical i w jakim celu się go stosuje:

Vagical jest lekiem homeopatycznym wskazanym w stanach zapalnych dróg rodnych objawiających się upławami, świądem, pieczeniem, zaczerwienieniem okolicy warg sromowych.

Dzięki korzystnemu składowi opartemu o naturalne, doskonale przebadane substancje czynne, Vagical świetnie sprawdza się przy podrażnieniach, otarciach, dyskomforcie czy początkach infekcji w okolicy kobiecych narządów rodnych. Zawarty w globulkach Vagical wyciąg z nagietka lekarskiego działa przyczynowo - przeciwgrzybicznie i przeciwbakteryjnie oraz objawowo – przeciwzapalnie, wspomagając gojenie i proces regeneracji. Vagical działa ściśle w miejscu podania co sprawia, że nie wywołuje interakcji z innymi lekami oraz antykoncepcją doustną. Po uprzednim zwilżeniu dobrze rozpuszcza się w wydzielinie błony śluzowej i uwalnia substancje czynną już po paru minutach, łagodząc objawy i zmniejszając świąd. Vagical osłania zmienione błony śluzowe, chroniąc przed utratą wilgoci i wnikaniem drobnoustrojów.

Wskazania:

Stany zapalne dróg rodnych objawiające się upławami, świądem, pieczeniem, zaczerwienieniem okolicy warg sromowych.
Przeciwwskazania: nadwrażliwość na którykolwiek ze składników leku.

Jak stosować lek Vagical:

Sposób użycia:

Lek przeznaczony jest do podawania dopochwowego.

Dorośle kobiety: 1 globulka 2-3 razy dziennie. Przed zastosowaniem globulkę należy zwilżyć przegotowaną, ostudzoną wodą.

Jeśli dolegliwości nasilą się lub nie ustąpią po 3-4 dniach stosowania, należy skontaktować się z lekarzem. W przypadku wątpliwości co do stosowania leku należy zasięgnąć porady lekarza lub farmaceuty.

Co zawiera lek Vagical:

Skład:

- Substancją czynną leku jest nalewka macierzysta z nagietka lekarskiego (*Calendula officinalis* TM) 150 mg/globulkę.
- Substancją pomocniczną to glikol polioksyetylenowy.

Informacje ważne przed zastosowaniem leku Vagical:

Kiedy nie stosować leku Vagical:

W nadwrażliwości (uczuleniu) na którykolwiek ze składników leku. W nadwrażliwości na rośliny z rodziny astrowatych Asteraceae (wcześniej złożonych Compositae) np. rumianek, jeżówka, arnika.

Dzieci i młodzież:

Nie stosować u dziewczynek poniżej 12 roku życia. Stosowanie u osób w wieku 12-18 lat po konsultacji z lekarzem.

Lek Vagical a inne leki:

Lek Vagical może być stosowany z innymi lekami.

Ciąża i karmienie piersią:

Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza lub farmaceuty przed zastosowaniem tego leku.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwane maszyn:

Lek nie wpływa na prowadzenie pojazdów i obsługiwane maszyn.

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych i dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego, bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Możliwe działania niepożądane:

Podczas stosowania leku mogą wystąpić objawy nadwrażliwości przejawiające się podrażnieniem błony śluzowej pochwy i sromu.

Jak przechowywać lek Vagical:

Przechowywać w temperaturze do 25°C, w miejscu niedostępnym i niewidocznym dla dzieci. Nie stosować po upływie terminu ważności zamieszczonego na opakowaniu.